

HEPATITAI A, B, C

Kepenys žmogaus organizme atlieka daugybę funkcijų, kurios yra svarbios organizmo vidinės terpės pastovumui palaikyti: dalyvauja visų rūšių medžiagų apykaitoje (baltymų, angliavandenių, vitaminų); jose kaupiasi daugelio vertingų medžiagų atsargos; kepenys filtruoja kenksmingas medžiagas patenkančias iš žarnyno, gamina ir išskiria tulžį, dalyvauja kraujo apytakoje bei termoreguliacijoje, o taip pat jose yra sintetinami kraujo plazmos baltymai.

Kas yra hepatitas?

Tai yra kepenų liga, kurią dažniausiai sukelia virusas. Hepatitas reiškia kepenų uždegimą. Hepatitai klasifikuojami į kelias rūšis, kurias sukelia skirtingi virusai. Kai tik virusas, patekęs į žmogaus organizmą, apsigyvena kepenų ląstelėse, sutrikdo normalų ląstelių aktyvumą, o po to ląstelės dauginasi.


Skirtingi hepatitą sukeliantys virusai plinta skirtingais keliais. Jeigu įtariate, jog sergate hepatitu, manote, kad kontaktavote su šia liga užsikrėtusiu žmogumi ar kitu užkrato šaltiniu, kuo greičiau kreipkitės į gydytoją.

Pasaulyje aprašyti jau penki hepatitų virusai, o šeštas dar laukia savo eilės, nors specialistai įtaria esant ir daugiau virusų. Jų atradimo eiliškumas žymimas abėcėlės raidėmis.

Virusinis A tipo kepenų uždegimas

Hepatitas A (sutrumpintai HAV) sukeliamas hepatito A viruso. Hepatitas A plinta per maistą ir geriamąjį vandenį, kurį užteršia infekuoto žmogaus fekalijos. Hepatitas A dažnai vadinamas „neplautų rankų liga“, kadangi užkratą kitiems žmonėms per maistą gali perduoti infekuojami nešiotojai, kurie pasinaudoję tualetu neplauna rankų su muilu ir vandeniu.

Pirmuosius simptomus žmogus pajunta per 15-50 dienų. Tai yra – pageltusi oda bei akių baltymai. Vė-



liau atsiranda pykinimas, silpnumas, patamsėja šlapimas, šviesios (dažnai baltos) išmatos. Neretai pasireiškia odos niežėjimas. Tam, kad būtų nustatytas hepatito tipas, būtina atlikti laboratorinius tyrimus. Susirgus hepatitu A galima toliau išlikti darbingu bei atlikti įvairias funkcijas ir gydytis namuose.

Virusinis B tipo kepenų uždegimas

Hepatito B virusai (HBV) gali sukelti sunkią hepatito B formą. Inkubacinis ligos periodas trunka 14-180 dienų. Svarbu, jog tuo metu žmogus, nejausdamas jokių ligos simptomų gali užkrėsti kitus žmones.

Hepatitu B užsikrečiama per nesaugius lytinius santykius, vartojant intraveninius narkotikus, taip pat naudojantis bendru dantų šepetuku, šukomis, per pedikiūrai bei manikiū-

ri naudojamus įrankius. Statistika rodo, jog net 40 % netinkamai gydomų pacientų, liga per 5 metus gali pereiti į lėtinę formą, o vėliau net į vėžį.

Medikų rekomenduojami skiepai nuo hepatito B yra veiksmingi.

Virusinis C tipo kepenų uždegimas

Hepatito C virusas (HCV) anksčiau vadintas „nei A, nei B hepatitu“. Šios ligos plitimas lyginamas su AIDS, kadangi daugiau nei 40% ligonių užsikrečia injekcijoms naudodami tas pačias adatas. 5 - 10 % žmonių užsikrečia lytiniu būdu (čia nesvarbi seksualinė orientacija). Kita dalis žmonių užsikrečia chirurginių intervencijų metu.

Inkubacinis šios ligos periodas trunka 6-12 savaičių. 15 % užsikrėtusiųjų liga pereina į kepenų vėžį.

HEPATO PROTECT®

Padėk sau ir kepenims

**Gerina
kepenų veiklą**

**Normalizuoja
riebalų apykaitą**

**Turi apsauginį
poveikį
kepenų audiniui**



alkoholis



riebus maistas



sunkiai virškinami
maisto produktai



Kodėl Hepato Protect?

Hepato Protect - tai natūralus preparatas gerinantis kepenų funkcionavimą ir lipidų apykaitą, apsaugantis kepenų audinį. Sinergetinio - tai yra bendro - artiškų ir tikrųjų margainių ekstraktų poveikio dėka, Hepato Protect regeneruojančiai veikia kepenis, žarnyną ir tulžies takus. Skatina tulžies išsiskyrimą, švelnina riebaus ir sunkiai virškinamo maisto vartojimo sukeltus negalavimus.

Idealus komponentų pasirinkimas

Hepato Protect - tai puikus artiškų ir tikrųjų margainių ekstraktų derinys. Tikrasis margainis nuo seno yra naudojamas kepenų cirozei gydyti. Šio augalo preparatai taip pat yra taikomi hepatitui, pakenktiems alkoholio kepenų audiniams, bei cukraligei gydyti. Artiškakas yra rekomenduojamas lipidų apykaitos sutrikimų atveju. Pastarieji skatina tulžies išsiskyrimą ir reguliuoja kepenų veiklos sutrikimus. Jie apsaugo kepenų audinį.

Maždaug 85% visų susirgusių pacientų liga pareina į lėtinį susirgimą. Panašiai kaip ir Hepatitas B, jei negydomas lėtinės HCV formos, didesnė tikimybė išsivystyti kepenų cirozei, kepenų vėžiui arba net kepenų nepakankamumui.

Andų medicinos centras rekomenduoja:

I etapas – organizmo valomoji programa:

- MANAYUPA – vartoti 3 kartus per dieną 1 val. prieš valgį arba 2 val. po valgio, po 1 stiklinę nuoviro arba po 2 kapsules;

II etapas – 3 mėnesių pagrindinė programa:

- HECAMPURI – vartoti 3 kartus per dieną 1 val. prieš valgį arba 2 val. po valgio, po 1 kapsulę;
- CHANCA PIEDRA – vartoti 3 kartus per dieną 1 val. prieš valgį arba 2 val. po valgio po 2 kapsules;
- VILCACORA 2005 – vartoti 3 kartus per dieną 30 min. prieš valgį po 1 kapsulę; arba
- VILCACORA (drožlės) – gerti 3 kartus per dieną 30 min. prieš valgį po 1 stiklinę drožlių nuoviro; arba
- VILCACORA – gerti 3 kartus per dieną 30 min. prieš valgį po 1 stiklinę antpilo, paruošto kiekvieną kartą iš dviejų pakelių žolės; arba
- VILCACORA FORTE plus – gerti 3 kartus per dieną 30 min. prieš valgį po 1 stiklinę antpilo pagaminto kiekvieną kartą iš vieno pakelio žolės; arba
- VILCACORA ekstraktas – vartoti 3 kartus per dieną 30 min prieš valgį po 15 lašų.
- SANGRE DE DRAGO – vartoti 3 kartus per dieną valgio metu arba iškart po valgio po 5 lašus.

Pabaigus antrą etapą rekomenduojama 30 dienų pertrauka, kurios metu siūloma vartoti MANAYUPA.